

PROGRAM SZCZEPIEŃ OCHRONNYCH SZCZEPIENIA OBOWIĄZKOWE DZIECI I MŁODZIEŻY WEDŁUG WIEKU

Wg Załącznika do Komunikatu Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 27 marca 2007 r. w sprawie zasad przeprowadzania szczepień ochronnych przeciw chorobom zakaźnym w 2007

wiek	Szczepienie przeciwko	uwagi
bezpośrednio po urodzeniu	WZW B - domięśniowo (pierwsza dawka)	Szczepienie noworodków przeciw gruźlicy powinno być wykonywane jednocześnie ze szczepieniem przeciw WZW typu B lub w dowolnym momencie przed wypisaniem dziecka z oddziału noworodkowego.
	GRUŻLICA - śródskórnie szczepionką BCG	
6-8 tydzień	WZW B - domięśniowo (druga dawka)	Drugą dawkę szczepionki WZW typu B należy podawać w 6-8 tygodniu życia jednocześnie z pierwszą dawką szczepionki DTP, a dawkę trzecią na przełomie 6-7 miesiąca życia. Trzy dawki szczepienia podstawowego DTP podawane są w odstępach 6-8 tygodniowych.
	BŁONNICA, TĘŻEC, KRZTUSIEC (pierwsza dawka) podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP	Dzieciom z przeciwwskazaniami do szczepienia przeciw krztuścowi szczepionką pełnokomórkową (DTPw) należy zastosować domięśniowo szczepionkę bezkomórkową (DTaP) w cyklu obowiązkowego szczepienia DTP. W przypadku orzeczenia całkowitego przeciwwskazania do szczepienia przeciw krztuścowi należy zastosować szczepionkę DT wg wskazań producenta.
	zakażenie HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b (domięśniowo lub podskórnie) (pierwsza dawka)	Trzy dawki szczepienia podstawowego przeciw HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b podawane są w odstępach 6-8 tygodniowych. Szczepionkę przeciw HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b można stosować jednocześnie z innymi szczepionkami, np. DTP, IPV, WZW typu B, ale w oddzielnych iniekcjach lub w postaci preparatów skojarzeniowych np. DTaP-HIB, DTP-IPV-HIB, DTaPIPv-HIB, DTaP-IPV-HIB-HBV - preparaty te nie są finansowane ze środków znajdujących się w budżecie Ministra Zdrowia.
3-4 miesiąc życia (po 6-8 tygodniach od poprzedniego szczepienia)	BŁONNICA, TĘŻEC, KRZTUSIEC (druga dawka) podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP	
	POLIOMYELITIS - podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa) (pierwsza dawka)	Szczepienie przeciw POLIOMYELITIS dzieci w 1 roku życia pierwsze dwie dawki - szczepionka inaktywowaną IPV . Pierwsza dawka na poziomie 3 i 4 miesiąca życia podawana jest jednocześnie z drugą dawką szczepionki DTP. Druga dawka w 5 miesiącu życia podawana jest jednocześnie z trzecią dawką szczepionki DTP.
	zakażenie HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b (domięśniowo lub podskórnie) (druga dawka)	
5-6 miesiąc życia (po 6-8 tygodniach od poprzedniego szczepienia)	BŁONNICA, TĘŻEC, KRZTUSIEC (trzecia dawka) podskórnie lub domięśniowo szczepionką DTP	
	POLIOMYELITIS - podskórnie lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa) (druga dawka)	

	zakażenie HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b (domięśniowo lub podskórnio) (trzecia dawka)	
7 miesiąc życia	WZW typu B - domięśniowo (trzecia dawka)	
13-14 miesiąc życia	ODRA, ŚWINKA, RÓŻYCZKA - podskórnio żywą szczepionką skojarzoną (pierwsza dawka)	Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia, należy ją podawać po upływie nie wcześniej niż po 4 tygodniach od wyzdrowienia.
16-18 miesiąc życia	BŁONNICA, TĘŻEC, KRZTUSIEC (czwarta dawka) podskórnio lub domięśniowo szczepionką DTP	Czwarta dawka, uzupełniająca szczepienia podstawowego DTP i trzecia dawka uzupełniająca szczepienia podstawowego przeciw polio. Dzieci z przeciwwskazaniami do podawania preparatu zawierającego komórkowy komponent krztuśca, które w 1 roku życia otrzymały trzy dawki DTaP
	POLIOMYELITIS - podskórnio lub domięśniowo szczepionką inaktywowaną IPV poliwalentną (1,2,3 typ wirusa) (trzecia dawka)	
	zakażenie HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b (domięśniowo lub podskórnio)	Czwarta dawka, uzupełniająca szczepienia podstawowego przeciw HAEMOPHILUS INFLUENZAE typu b.
6 rok życia	BŁONICY, TĘŻCOWI, KRZTUŚCOWI - domięśniowo szczepionką DTaP zawierająca bezkomórkowy komponent krztuśca	Pierwsza dawka przypominająca szczepionki przeciw błonicy, tężcowi i krztuścowi (komponent bezkomórkowy).
	POLIOMYELITIS - doustnie szczepionką atenuowaną poliwalentną OPV (1,2,3 typ wirusa)	Pierwsza dawka przypominająca - szczepionka atenuowana (OPV).
10 rok życia	ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE - podskórnio żywą szczepionką skojarzoną	Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia, należy ją podać po upływie co najmniej 2 miesięcy od wyzdrowienia.
11 rok życia	ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE - podskórnio żywą szczepionką skojarzoną	Szczepieniu podlegają wyłącznie dziewczęta nie szczepione w 10 roku życia. Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia. Szczepionkę należy podać po upływie, co najmniej 2 miesięcy od wyzdrowienia.
12 rok życia	ODRZE, ŚWINCE, RÓŻYCZCE - podskórnio żywą szczepionką skojarzoną	Szczepieniu podlegają wyłącznie dziewczęta nie szczepione w 10 lub 11 roku życia. Podawane w wywiadzie przebycie zachorowania na odrę, świnkę lub różyczkę nie jest przeciwwskazaniem do szczepienia. Szczepionkę należy podać nie wcześniej niż po 4 tygodniach od wyzdrowienia.
14 rok życia	WZW typu B - domięśniowo, 3-krotnie w cyklu 0; 1; 6 miesięcy	Szczepienie należy podać młodzieży w gimnazjum (I lub II klasa). Nie należy szczepić osób uprzednio zaszczepionych podstawowo przeciw WZW typu B w ramach szczepień zalecanych lub obowiązkowych.

	BŁONICY, TEŻCOWI - podskórnice lub domięśniowo szczepionką Td	Nie przewiduje się podawania dawek przypominających. Dawka przypominająca. Szczepienie można podać jednocześnie (tzn. w ciągu 24 godz.) z jedną z dawek szczepionki przeciw WZW typu B w oddzielnej iniekcji.
19 rok życia lub ostatni rok nauki w szkole	BŁONICY, TEŻCOWI - podskórnice lub domięśniowo szczepionką Td	Trzecia dawka przypominająca; nie powinna być podana wcześniej niż po upływie 5 lat od ostatniej dawki szczepionki Td.